


# AZUFRE QUIMUR

Fungicidas  
Granulado dispersable en agua

<b>Composición:</b>	Azufre 80% p/p
<b>Formulación:</b>	Granulado
<b>Envases:</b>	45g, 1, 5 y 25 kg
<b>Nº Registro:</b>	19529
<b>Clasificación Toxicológica:</b>	Xi (A-A-A)



**Azufre quimur:** Tratamientos fungicidas-acaricidas en cultivos y plantaciones agrícolas.

## Aplicaciones autorizadas:

- Cereales** contra oidio.
- Frutales de hoja caduca** contra araña roja, eriofidos y oidio.
- Frutales subtropicales/tropicales** contra araña roja, eriofidos y oidio.
- Hortícolas** contra acaros, araña roja, oidio, y oidiopsis.
- Lúpulo** contra araña roja y oidio.
- Olivo** contra araña roja y negrilla.
- Ornamentales leñosas:** contra araña roja y oidio.
- Remolacha Azucarera:** contra araña roja y oidio.
- Vid** contra araña roja, eriosis y oidio .

## Dosis y modo de empleo:

Aplicar en pulverización desde 0,25% hasta 0,75%, variando la dosis según temperatura ambiental, cultivo, época de tratamiento, etc.

## Plazo de seguridad:

Entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, o entrada de ganados, han de transcurrir: No procede.

## Observaciones:

No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas. No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva. No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

## Gestión de envases:

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión SIGFITO. (símbol sigfito).